

lato, sepalis lateralibus oblongis paullo obliquis apice obtusis ad basin paullo contractis c. 6 mm. longis medio 3 mm. latis. Petala obovata, paullo obliqua, apice rotundata, basi contracta, c. 6 mm. longa, medio $3\frac{1}{3}$ mm. lata, crassa, glabra.

Labellum ad basin columnae sessile, hypochilio saccatum, sacco oblongo-hemisphaerico paullo complanato apice rotundato c. 6 mm. alto flavescente intus et extus glabro, epichilio semiorbiculato vel triangulato-semiorbiculato apice rotundato-obtuso basi truncato margine integro c. 4 mm. longo basi 7 mm. lato supra ad medium callo instructo ad callum puberulo subtus glabro. Columna brevis, crassa.

Nom. Jap. Kirigakure-kintyaku-ran (nov.).

Hab. Formosa: praef. Takao, Naihonroku-goe, in *Quercetis* prope Hudi-eda, c. 1500 m. alt. (N. FUKUYAMA! Oct. 24, 1934. no. 4720. Typus in Herb. Orch. Fuk.).

67) **Habenaria linearipetala** HAYATA, Icon. Pl. Form. IV. (1914) p. 126, Pl. XXIII; Schlechter, Orch. Sino-Jap. Prodr. (1919) p. 131.

Nom. Jap. Nagaba-sagisô.

Hab. Formosa; insl. Kôtô-syo, in pluvisilvis prope Imaururu, c. 200 m. alt. (N. FUKUYAMA! Nov. 20, 1934. no. 4833, 4834).

Distrib. Formosa, Insl. Kôtô-syo.

68) **Disperis orientalis** FUKUYAMA, sp. nov.

Terrestris, erecta, pusilla, c. 8 cm. alta, tuberibus parvulis ovoideis vel oblongoideis pilosis. Caulis strictus, simplex, carnosulus, teres, superiore paullo angulatus, basi vagina 1 breve acuta arete amplectente praeditus, medio remote bifolius, foliis sursum sensim in bracteas decrescentibus.

Folia erecto-patentia, orbiculato-ovata vel ovata, apice acuta, basi cordato-amplexicaulia, 10–12 mm. longa, infra medium 8–10 mm. lata, membranacea, utrinque glabra, venoso-nervosa.

Racemus erectus, laxe circ. 3-floratus, bracteis foliaceis ovatis acutis sursum sensim minoribus. Flores lilacini, apertientes, pedicellis cum ovariis rectis glabris leviter angulatis bracteas longitudine duplo superantibus c. 10–14 mm. longis. Sepalum intermedium cum petalis in galeam connivens, lanceolatum, apice acutum, c. 6 mm. longum, membranaceum, glabrum, trinervatum; sepala lateralia obliqua, falcato-ovata, apice acuta, basi paullo attenuata, infra medium in saccum brevem obtusum producta, c. 6 mm. longa, membranacea, glabra, trinervata. Petala oblongo-lanceolata, obliqua, concava, apice acutiuscula, basi contracta, margine exteriori undulata, cum sepalo intermedio subaequilonga, membranacea, glabra, trinervata.

Labellum dimidium petalorum paullo superans, cum columna adnatum, apice tripartitum, partibus lateralibus patentibus vix $2\frac{1}{2}$ mm. longis line-